

Maandkalender: activiteiten in de maand januari

Activiteit	Hoe / wat / wanneer welke dieren	Doel / Actie / Opmerking
Management		
Schoonmaken farm /fokafdeling	Z.s.m. na de pelstijd, bij voorkeur voor een vorstperiode	Afvoeren organisch materiaal, schoonmaken en ontsmetten, voorkom schoonmaakwater in mest
Bijwerken administratie	Na de pelstijd	Weten wat je hebt en waar je staat
AD-testen of	Alle fokdieren	Dieren verplaatsen na uitslag naar schone afdeling
Jodiumtesten of	Alle fokdieren	Positieve dieren uitsluiten voor reproductie.
ELISA-test	Alle fokdieren of teven met ELISA 3&4 in November	Dieren met te hoge waarde uitsluiten voor reproductie
Verzorging	Dieren goed in het stro	Behaaglijke omgeving
Conditioneren		
Wegen van dieren of	Min. 10 reu en 25 teef per kleur / 2 weken	Gewichtafname beoordelen
BS-beoordeling	Alle fokdieren, schaal 1 tot 5	Aanmerken te dikke en te magere, voerportie sturen naar BS
Voerportie per BS bij	Min. 25 reu en 25 teef per kleurslag	Selectiegrens bepalen, rekening houden met huisvesting: groep/klauter Reu mag 150-200 gram minder zijn.
Als dieren allemaal apart zitten	Individueel gericht voeren naar Body Score	Conditioneren beter te sturen, rekening houden met grootte en gewicht
Afvallen	Licht beginnen – licht eindigen Zwaar beginnen – licht eindigen Zwaar beginnen – zwaar eindigen	Meeste jongen Middelmatig aantal jongen Minste jongen
Selectie		
Op pelskwaliteit	M.n. reuen eventueel voor 2e keer selecteren in januari	Dieren die 2e keer ook mooi zijn hebben voorkeur
Op ongewenst gedrag	D.m.v. handschoentest gewenst: besnuffelen ongewenst: bang of bijten	Teven met ongewenst gedrag: productiegroep. Reuen met ongewenst gedrag: uitsluiten voor reproductie
Beoordelen stereotiepe gedrag 4 uren voor voeren vanuit onopvallende positie	Langs zijwand ren op en neer rennen, met kop om drinknippel draaien, rechtop staan en dan weer rennen en rechtop staan etc,	Deze stereotiepe dieren en hun pups uitsluiten voor fokkerij volgend jaar
Extra aandacht bij vorstperiode		
Conditioneren	Dieren geen beperkte voergift. Per 1°C vorst 5-10 gram voer extra	Door kou verbranden dieren al meer lichaamsreserves. Door beperkte voergift eerder uitval. Vooral dunne nertsen veel extra voer, dikke nertsen nauwelijks.
Verstrekt voer	Aandrukken	Bevroren voer moet wel bereikbaar zijn.
Water	Handmatig met suiker (bevriezing vertragen) of rondpomp systeem	In voer zit niet genoeg water, nertsen hebben water nodig om te overleven.
Waterleiding bevroren	Ijsblokjes, bakje voor water	Handmatig water geven, nertsen likken ijs voor vocht. Nertsen hebben water/ijs nodig!
Verzorging	Voldoende stro in nachthok	Om lekker nestje te maken