

## Maandkalender: activiteiten in de maand februari

Activiteit	Hoe / wat / wanneer welke dieren	Doel / Actie / Opmerking
<b>Management</b>		
Reinigen / ontsmetten / repareren	Rennen, nachthokken,	Verlagen infectiedruk.
Controleren van diverse systemen, zoals	Drinkwatersysteem, meststelsysteem, alle dieren een dierenkaart, voermachine, farmafscheiding	Dat het werkt wanneer het moet werken.
Verzorging	Dieren goed in het stro, nestvervuilers een kleiner nachthokgedeelte geven	Hygiëne en welbehagen.
Testen op AD	Vooraf de reuen, mogelijk alle dieren, counter-test of Elisatest	Beheersen of verbeteren AD-status. Bij voorkeur testen voor vaccinatie Honden-ziekte i.v.m. wachttijd (min. 3 weken).
Testen Elisawaarde	Jonge teven en Oude teven Elisa 4	Jonge teven kunnen veel hogere Elisawaarde hebben t.o.v. november. Advies = uitsluiten voor fokkerij of bij elkaar plaatsen i.v.m. infectiedruk
Vaccineren Hondenziekte	Hele fokbestand, óók de reuen!!!	Voorkomen infectie Hondenziekte. Vaccineren afgerond min. 3 weken vóór paarperiode.
<b>Reproductievoorbereiding</b>		
Conditioneren	Aanpassen voerhoeveelheid a.d.h.v. conditie dieren. Controle door dieren te wegen en/of te scoren op BS (Body Score)	Geleidelijk laten afvallen zodat eind februari gewenst gewicht bereikt is: Dieren te mager → onrustig (agressief) Dieren te vet → slechte reproductie (lui) Dieren niet al vroeg mager → uitval bij vorstperiode.
Conditiebeoordeling fokgroep; Body Score (BS)	Score 1-5: te mager - te vet. Voeren naar BS 2-3 Registreren op kaart	BS heeft grote invloed op reproductie: paren, gust, werpen, pupuitval, groei pups.
Voergift	Laatste weken februari terughoudend	Zodat vóór paren teven geflusht kunnen worden (voeren naar eetlust t.b.v. meer rijpe eicellen).
Controle op overactieve en agressieve dieren	Vooraf agressieve reuen Let op: voerbepaling maakt onrustig	Agressieve dieren uitsluiten voor reproductie of alleen voor productiegroep gebruiken.
Testikelcontrole	Reuen moeten 2 goed ontwikkelde testikels hebben	Reuen met gebreken: slechte reproductie. Testikelafwijking heeft hoge erfelijkheidsgraad.
Opzetten paarsysteem	Afhankelijk van soort paring; lijnparing of kruisparing of alleen afparen	Hogere reproductie bij kruisparing. Hogere genetische vooruitgang bij lijnparing.
Plaatsen van dieren op praktische plaats	Afh. van huisvesting en paarsysteem	Voorkom lange looplijnen in paarperiode.
Verplaatsen van dieren	Door omstandigheden	Net vóór paarperiode, minste storing bronstontwikkeling.
Kunstlicht	Worden dieren in jan./febr. aan blootgesteld.	Bronst begint en eindigt te vroeg → slechte reproductie.
<b>Extra aandacht bij vorstperiode</b>		
Conditioneren	Dieren geen beperkte voergift maar verhoogde voergift.	Door koude verbranden dieren al meer lichaamsreserves. Per graad vorst → ± 5 gram voer extra. Let op: dunne nertsen veel grotere portie dan dikke nertsen.
Verstrekt voer	Aandrukken	Bevroren voer moet wel bereikbaar zijn.
Water	Handmatig met suiker (bevrozing vertragen) of Forelco / Columbus systeem (rondpompen)	Als dieren voldoende voer opnemen is daarmee vochtbehoefte gedekt, toch raadzaam water te verstrekken; dieren hebben water nodig om te overleven.
Verzorging	Voldoende stro in nachthok	Om behaaglijk nestje te maken.