



Maandkalender: activiteiten in de maand maart

Activiteit	Hoe / wat / wanneer welke dieren	Doel / Actie / Opmerking
Management		
Verzorging	- Dieren goed in het stro, nestvervuilers een kleiner nachthokgedeelte geven - in aanloop naar paren: Rust en Regelmaat op de farm	- Hygiëne en welbehagen - Onrust is negatief voor bronstontwikkeling
Controleren gezondheidsstatus	Tijdens testikelcontrole: Natte buiken, bleke voetzolen, doffe pels	Mindere dieren uitsluiten voor fokbestand, gebruiken voor productiegroep. Evt. behandeling alle dieren.
Reproductie voorbereiding en Paren		
Conditioneren tot flushen	Aanpassen voerhoeveelheid a.d.h.v. conditie dieren. Controle door dieren te wegen of scoren BS.	Geleidelijk laten afvallen zodat op moment flushen gewenst gewicht is bereikt of BS 2/2+ Voorkomen minder spermakwaliteit Voorkomen minder aantal rijpe eicellen
Testikelcontrole	Reuen moeten 2 goed ontwikkelde testikels hebben; geen erwtjes	Reuen met gebreken: slechte reproductie. Testikelafwijking heeft hoge erfelijkheidsgraad
Voerverstrekking	- elke dag - flushen: 3 dagen voor paring verhoogde voergift - tijdens paarperiode: aan einde van de dag voeren - na paring: t/m innesteling onderhoudsniveau ± 170 gram (voer ME 1150 Kcal/kg)	- Geen verstoring bronstontwikkeling - Verhoogde bronst en eisprong - Anders verliezen reuen aandacht voor hun taak (liefde gaat door de maag) - Voorkomen embryosterfte
Flushen en vangen van dieren voor paring	Dieren in groepen verdelen en iedere groep aparte kleur	Aan de kleur herken je wat er moet gebeuren
Paarsysteem	- lijnparing /fokdieren of kruisparing /productiegroep - jonge teven 1-8-1 of 1-1-8-1 - oude teven 1-1	Hoge reproductie en goede genetische vooruitgang. Hoogste worpresultaat naar aantal paringen per teef. Herparing erg belangrijk.
Paren	Teef naar reu, binnen 10 min. nekbeet	Geslaagde paring, anders kan teef terug
Na paring: Rust en Regelmaat op de farm	Teven niet verplaatsen, of direct na laatste paring	Voorkomen embryosterfte. Verplaatsen eventueel na 15/4.
Extra aandacht bij vorstperiode		
Voerverstrekking	Dieren minder beperkte voergift; elke graad vorst = ± 5 gram extra voer (voor dunne nertsen)	Voorkom gewichtafname en vooral uitval.
Verstrekt voer	Aandrukken	Bevoren voer moet wel bereikbaar zijn.
Water	Handmatig met suiker (bevriazing vertragen) of Forelco/Columbus systeem	Dieren hebben water nodig om te overleven. Bij vorst ook minder voeropname.
Verzorging	Voldoende stro in nachthok	Om lekker nestje te maken