

Maandkalender: activiteiten in de maand mei

Activiteit	Hoe / wat / wanneer welke dieren	Doel / Actie / Opmerking
Management		
Verzorging	Rust, Regelmaat en Reinheid op de farm	De teven in staat stellen tot best mogelijke verzorging pups
Strooisel	Teef moet nest kunnen bouwen	Deens onderzoek: Betere verzorging door teven die nest kunnen bouwen
Registratie geboorte datum en tellingen	Tellingen op dag 1 (dag na geboorte) en op 21 dagen	Goede planning werkzaamheden, tijdig overleggen, administratie ten behoeve van dierenselectie
Pupscore	Bij controle op dag 1: klein-normaal-groot	Worpen met kleine pups markeren en vaker controleren
Bovenkooien	Afsluiten	Teef kan pups vergeten: uitval
Observeren en luisteren geluiden op farm	Signaleren problemen, teven onrustig en slepen met jongen	Oorzaak achterhalen en ingrijpen
Verplaatsen 0-nest teven	Direct wanneer 0-nest geconstateerd is naar gedeelte zonder worpen	Deze teven hebben negatieve invloed op burens met pups: meer uitval. Meer ruimte ten tijde van verspenen.
Overleggen pups	Tot 3 weken leeftijd geen probleem	Nekklieruitscheiding is signaal voor moedergedrag, na 3 weken is dat over
Overleggen pups	Als mogelijk is niet meteen op dag van werpen	Eerst inzicht in groei van pups en evt. problemen
Beoordelen overleggen pups	Worpgrootte en conditie pups.	Uit grote nesten >9-10, of pups van slechte moeders. Best renderende moeders: 6-8 pups.
Geboortegewicht en overlevingskans	Teefjes: <7gr vs 8-9 gr vs 9-10 gr Reuen 1 gram zwaarder	Sterfte: 35% vs 12% vs 5% (Spelderholt). Sterfte reuen zelfde beeld.
Tellen actieve spenen	Tussen week 2 en 3, bij potentiële fokdier leveranciers	0,5 pup/worp minder uitval bij gelijk of meer spenen als pups. Selecteren op speenaantal (min. 7 of 8) is positief voor fokresultaat
Verplaatsen guste teven	Alle teven zonder worp op bv.17 mei naar gedeelte zonder worpen	Deze teven hebben negatieve invloed op burens met pups: meer uitval. Meer ruimte ten tijde van verspenen.
Werpen en lactatie periode -> voorkomen pupsterfte		
Voerverstrekking geworpen teven	Dag van werpen en volgende dag beperkt, daarna heel langzaam opvoeren afhankelijk worpgrootte.	Voeren naar behoefte van de dieren, geen oud voer op de rennen: hygiëne Voerresten: geen gift verhoging maar controle nest
Dagelijkse voederstijging	Afhankelijk worpgrootte, vanaf dag 3 tot 4 weken leeftijd	Dagelijkse stijging: 1-2p 1%, 3-4p 2%, 5-6p 3%, 7-8p 3,5%, 9-10p 4%
Bevorderen opname gehamsterd voer	Enkele (3-4) uren per dag geen voer op kooi tot mee-eten pups	Voorkomen bederf gehamsterd voer in nestkist: slechte hygiëne
Voeren op klep nachthok	Controleren melkpakketten van ± 30 teven	Melkpakketten leeg: op klep voeren Melkpakketten nog vol: uitstellen Melkpakketten warm&geïrriteerd: raadpleeg uw dierenarts
Voeren op klep nachthok	Mee-eten pups vanaf 4 weken. Voer verdunnen met water tot pups goed zelf water drinken	Must voor goede groei start, benutten groeimogelijkheid. Meer vocht in voer ontlast de teef.
Voerportie teef	Als pups mee-eten, 150-200 gram op ren voeren	Rustige voeropname door teef en signaleren als problemen zijn: voerweigerings = actie
Controle drinkwatersysteem	Pups eten = pups drinken.	Druk op nippel en leiding zo laag mogelijk. Drinken is moeilijker voor pups.
Voerverstrekking drachtige teven	- teven 'graag' houden - voeren naar gedrag teef - ± 175 gram	- Geen voerresten op rennen: hygiëne - teef in nachthok: weinig voer - met 4 poten tegen het gaas: meer voer
Voerwagen en silo	Dagelijks schoonspuiten	Hygiëne = verlagen infectiedruk
Inspecteren en schoonmaken nestkist	Verwijderen voer en mestresten, gebruik vlooienpoeder	Voorkomen is beter dan genezen
Verwijderen mest op inleghorren	Tijdig, uiterlijk na 4 weken met inleghor	Hygiëne, stankoverlast en minder vliegen. Mest in mestput (fosfaat)
Vanaf eerste nestje	's morgensvroeg en 's avonds (vooral bij heet weer) controle rondje over farm	Pas geboren pups die buiten nest liggen snel terug leggen. Teef wil buitengeslepen pups wel eens 'vergeten'.
Signaleren melkziekte problemen	Geboorteproblemen, geen melk, mastitis, luid piepende pups, uitdroging	Raadpleeg uw dierenarts en collega fokkers

Vervolg op pagina 112.

Bij hoge temperaturen		
Voerverstrekking	Minimaal 2 voerbeurten. 1ste zo vroeg mogelijk, laatste = afvoeren zo laat mogelijk (avond)	Bewaken hygiënische kwaliteit. Vaak kleine porties voeren maakt teef actief; gaat drinken en eet een beetje. Heel laat voeren op klep i.v.m. warmte vanuit het nest.
Voorkomen warm water	Water door laten lopen. Indien Geen Forelco dan klein gaatje in slang na laatste bakje of kraantje aan einde slang	Teven drinken minder = kans meer uitval. Meestal alleen aan de middag-zonkant. Gaatje in avond afsluiten door stukje rubber van tepelvoering er over te schuiven. Met kraantje ook drukmeter i.v.m. druk op nippel
Extra controle op pups buiten het nest	Voorkomen zonnebaders	Voorkomen pupuitval
Zoeken naar verkoeling	Zorg dat nest kan luchten, vernevelen in shed/hal, daken sproeien	Voorkomen dat teven (panisch) met pups gaan slepen met uitval tot gevolg