

Maandkalender: activiteiten in de maand november en december

Activiteit	Hoe / wat / wanneer welke dieren	Doel / Actie / Opmerking
Management		
Controle pelstijd benodigdheden	Afstellen apparatuur / gereedschap, planning werk & personeel	Geen vervelende verrassing als pelsperiode begint, voldoende voorraad van materialen
Strooisel in nachthok	Zeer regelmatig aanvullen, moet altijd aanwezig zijn, ook bij fokdieren	Positief voor doorkomen verharingsperiode, schoonhouden pels en voorkomen van klitten. Klitten en Chip kosten geld.
Mest verwijderen	Uit ren en nachthok	Dieren niet bevuild raken, klitten in pels
Schoonmaken farm / fokafdeling	Z.s.m. na de pelstijd, verwijderen van al het organisch materiaal, afbranden haren, schoon spuiten	Schoonmaken en ontsmetten, voorkom schoonmaakwater in mest, verlagen infectiedruk
Bijwerken administratie	Na de pelstijd	Weten wat je hebt en waar je staat
AD-testen	Fokdier kandidaten	Dieren verplaatsen naar schone afdeling na AD-uitslag
I – testen	Fokdier kandidaten	Nieuw fokbestand met I-neg dieren
ELISA-testen	Fokdier kandidaten	Nieuw fokbestand met zo laag mogelijke ELISA waarde
Selectie & Pelsrijpheid		
Wegen van dieren	Min. 25 reu en 25 teef per kleur	Selectiegrens bepalen
Selecteren dieren	Reuen; grens kan strenger (minder nodig dan teven)	Nestgrootte minder van belang, gewicht hoger dan, geen negatieve gedrag kenmerken Selectie grens voor reuen uit groep 150-200 gram lager. Deze zijn slanker maar hebben de lengte.
	Teven; minder streng, maar meer criteria	Nesten > 6, goede moedereigenschappen (uitval, speengewicht, voldoende tepels (>7)), wintergedrag: niet stereotiep, agressief of angstig
Metten van lichaamslengte	Sterke invloed pelslengte en erfelijk bepaald	Korte Reuen (<48 cm) en teven (<38 cm) niet aanhouden voor fokkerij.
Beoordelen pelskwaliteit	Eind oktober tot half november, als pels rijp is	Selecteren dieren met gewenste kwaliteit eigenschappen (en gewicht)
Pelsrijpheid volgorde	Blauwe nertsen, Pearl en Witte nertsen, Wildtypen, Standard nertsen	Planning pelsperiode
Pelsrijpheid	Teven eerder dan reuen	Planning pelsperiode
Pelsrijpheid	Gekoppeld aan leeftijd: oudste 'pups' (van jonge teven) eerder pelsrijp	Planning pelsperiode
Beoordeling pelsrijpheid	Verharing begint aan staart en eindigt bij oren; oren moeten in pels verzonken zijn, geen losse haren en/of stoffig.	Hoogst kwalitatieve pels bij afpelzen, maar niet mogelijk alle dieren zelfde dag te pelzen. Gedeelte kan al eerder gepeld worden.
Pelzen		
Gebruik kist	Zaagsel / krullen in kist gebruiken	Voorkomen vettig worden pels
Zaagsel in nachthok	Aan pelsdieren, 1-2 dgn. voor pelzen	Zaagsel maakt dat de nertsen zich mooi schoon maken, kruipt in pels.
Pelzen z.s.m. laten afkoelen	Warme pelzen niet stapelen, laten besterven op koude vloer of rek. Dieren op rug leggen.	Broei resulteert in haaruitval na drogen
Voldoende zaagsel gebruiken	Schraapbalk schoon en vetvrij	Ook planken moeten schoon en vetvrij zijn
Tijdens pelsperiode	Rommel direct opruimen	Voorkomen ongedierte
Voer & voeren		
1 x daags voeren	Zelfde tijden i.v.m. regelmaat	Voorkomen overeten en stilvallen, zorgen dat nertsen 'graag' blijven.
Nertsen (geen fokmateriaal) met te lage voeropname in november pelzen	Voerportie < 160 g/d/d	Leidt snel tot gewicht en pelslengte verlies
Voeren fokdieren	Fokdieren iets terugnemen, geleidelijke conditionering	Geen grote stappen omlaag in voergift; slecht voor gezondheid, geeft gedragstoornissen.
Voerwagen en silo	Regelmatig schoon spuiten	Hygiëne